

HEPATITE DELTA

Bonus



MODE DE TRANSMISSION

Pas d'hépatite Delta sans hépatite B

Transmission: identique à l'hépatite B : sanguin/sexuel

Co-infection ou surinfection d'une hépatite B



DEPISTAGE

Dès que antigène HBs présent : rechercher sérologie Delta par bilan sanguin

Si sérologie Delta+ : rechercher la virémie Delta (présence ARN)

Mesure de la fibrose, gold standard biopsie hépatique

Echographie hépatique dépistage CHC



EVOLUTION

atteinte hépatique plus sévère avec une évolution plus rapide de la maladie vers une cirrhose

 importance pour les patients coinfectés B-Delta d'accéder à un traitement

TRAITEMENTS

Les traitements sont sous forme d'injections sous cutanées quotidiennes avec reconstitution du produit (pas de stylo)

Les flacons se conservent au réfrigérateur.

Nécessité de conditions d'hébergement stable et salubre

Les patients issus de populations vulnérables doivent pouvoir bénéficier d'un accès facilité à un hébergement sous peine de perte de chance dans l'évolution de leur maladie

Durée non déterminée : plusieurs années

Intérêt de l'éducation thérapeutique du patient pour les autonomiser et leur apprendre à réaliser eux même l'injection

