Principes de l'entretien pré et post-test

Aider, informer, soutenir, traiter, orienter





Une attitude, une posture




- approche centrée sur la personne
- Ecoute active
- Suspension du jugement, acceptation inconditionnelle de l'autre (pas de conseil, solution miracle ou culpabilisation)
- Etre en empathie
- Etre « réellement » soi-même, sans masque ni façade (congruence)
- Croire que chaque personne est détentrice de ses propres solutions
- Rester dans l'ici et maintenant



Maintenir le contact visuel

Signes non verbaux d'écoute opiner, "humhum"...







Entretien pré-test



- Explorer les circonstances de la prise de décision du dépistage, les antécédents de dépistage
- Explorer les prises de risques liées à la consommation de produits ou à la sexualité
- Evaluer les connaissances et les représentations sur les hépatites, le VIH, leurs modes de transmissions, les traitements actuels et compléter par l'apport d'informations
- Dans quelles circonstances cette personne prend-elle des risques ? Qu'est-ce qui l'amène à le faire? Comment réduire ses risques d'après elle?
- Echanges d'informations
- Anticipation du résultat ++ : si le test se révélait positif nous sommes là pour orienter, accompagner, aider à la mise en traitement...
- Recueillir le consentement éclairé
- Réaliser les tests même si les prises de risques sont récentes

Un entretien pré-test bien mené facilite le rendu des résultats!



Entretien post-test négatif



- Informer sur la signification du résultat en lien avec l'entretien prétest, inciter à renouveler le test si prises de risques récentes
- Evaluer l'impact des résultats dans la démarche de prévention de la personne, évaluer sa vulnérabilité ou ses forces
- Accompagner la personne dans sa prise de décision pour adopter ou maintenir des comportements qui amélioreront sa santé
- Veiller à l'appropriation des messages RDR pour conserver ce statut négatif
- Orienter vers d'autres partenaires si besoin (sociaux, RDR, addicto)
- Prise en compte des obstacles ou capacités de soutien de l'entourage




Entretien post test positif



- Signification du résultat (sérologie): nécessité de confirmation
- Recueillir le ressenti, écouter les questions y répondre dans la mesure de ses compétences, accompagner
- Identifier les besoins immédiats et premières inquiétudes
- Plus value de connaître son statut positif : pour soi (traitement, suivi) et les autres (protection)
- Informer sur l'infection détectée et les modes de contamination/protection des proches
- Conseiller, assister, pour l'adoption ou maintien de comportements plus sécuritaires
- Orienter vers d'autres partenaires si besoin (sociaux, RDR, addicto)
- Planifier les démarches nécessaires pour le suivi médical et autres ressources

Avant de se quitter ...

- Ne pas se séparer sur un malentendu!
- Reformuler les décisions et accords pris
- Montrer à l'autre qu'il a été entendu
- Orienter







Barrières et facteurs de motivation au dépistage






BARRIERES

- Difficulté d'avoir à affronter un résultat positif (alors que pas de symptômes)=malade
- Peur d'être stigmatisé
- Anxiété liée au dépistage (pas de réseau veineux)
- Temporalité (je suis pressé, pas aujourd'hui...)
- Autres préoccupations : logement, nourriture, produits...
- Méconnaissance des hépatites et peur de l'Interferon
 - Problèmes psychiatriques et effets des drogues

LEVIERS

- Connaissance du statut sérologique
- Protection des proches/partenaires
- Tests anonymes et gratuits, respect de la personne, secret médical
- Tests non invasifs
- Rapidité du rendu des résultats
- Orientation concernant les autres problématiques (sociales, sanitaires, addictives...)
- Santé: possibilité de guérison (hépatite C) de stabilisation des maladies, éviter les aggravations
- Recours aux pairs déjà dépistés ou traités







Janis et Mann_ 1971 BALANCE DECISIONNELLE

Faciliter la prise de conscience

- Permet à la personne d'objectiver l'ambivalence naturelle qui s'oppose aux changements
- Débuter par les avantages et les inconvénients de la situation actuelle, puis les inconvénients et les avantages à changer

Si je ne me fais pas dépister	Si je ne me fais pas dépister	Si je me fais dépister	Si je me fais dépister
Avantages	Inconvénients	Inconvénients	Avantages
 Je ne me sens pas malade Pas de mauvaise nouvelle Statu quo Je ne change rien à mes habitudes ,mes pratiques etc 	 - La maladie peut évoluer sans symptôme - Risque de cirrhose ou cancer du foie - Risque de transmission aux proches 	- En cas de positivité: bilan complémentaire, RDV médical - Prise d'un traitement - Suivi médical - Prévenir l'entourage (peur de stigmatisation)	 Rapide et sans douleur Résultat immédiat Traitement bien toléré et efficace Guérison : pas d'évolution de la maladie Protection des proches La peur n'évite pas le danger!

Si c'est toujours NON ...

- La personne peut refuser : c'est son droit
- Ce n'est peut-être pas le bon moment : alcoolisé+++, sous produits
- Pas en capacité de comprendre : décompensation psychiatrique
- Problème de langue : consentement libre et éclairé : prendre RDV pour une autre fois avec un traducteur ou outils de traductions adaptés

RESTER DISPONIBLE ET OUVERT POUR UNE AUTRE OPPORTUNITE



