

Détection des anticorps du virus de l'Hépatite C

Procédure simplifiée HCV Rapid test (REF: ITP01153-TC10)



Utiliser la lingette antiseptique fournie pour désinfecter le doigt au niveau de l'endroit où vous souhaitez effectuer le prélèvement. Opter pour le majeur ou l'annulaire. **Laisser sécher avant de procéder au prélèvement.**



Placer la lancette de sécurité fournie avec le kit au bout du doigt puis déclencher la piqûre **en appuyant légèrement sur le point de prélèvement.**



Essuyer la 1^{ère} goutte de sang avec une compresse stérile puis masser le doigt sur la longueur pour former une grosse goutte de sang suspendue.



Recueillir la goutte de sang en approchant la pipette **horizontalement sans appuyer sur la poire.** Le sang monte par capillarité jusqu'au trait noir (10 µL). Un sachet de 20 pipettes (REF.1010-10) est fournie avec chaque lot de kit à part.



Placer la pipette **verticalement au contact du puit « S »** puis vider le contenu en appuyant sur la poire.



Ajouter immédiatement **2 gouttes de diluant** dans le puits «D» de la cassette.

Interprétation des résultats

	C	T
15	■	■
■	■	■
■		
■		

Lire le résultat à **15 minutes**
Ne pas lire au-delà de 20 min

Résultats positifs

Résultat négatif

Résultats invalides

