

UN TRAITEMENT POUR TOUS,
UNE GUÉRISON POUR CHACUN ET
UNE PROTECTION UNIVERSELLE !

*L'association SOS hépatites Fédération groupe des associations
ayant pour but la prévention, l'information, la solidarité, la défense
de toutes les personnes concernées
par les hépatites virales et les maladies du foie.*

SOS hépatites Fédération
14 rue de la Beaune
93100 Montreuil
www.soshepatites.org



 Association SOS hépatites Fédération

 @SOSHepatitis

 **sos hépatites**
Fédération

 **N° Vert 0 800 004 372**
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

 **sos hépatites**
Fédération

C'
MON TRAITEMENT



Mon traitement est une combinaison de plusieurs médicaments

Plusieurs traitements sont disponibles contre le virus de l'hépatite C et d'autres vont arriver.

Les taux de réussite de ces traitements avec des molécules Antivirales à Action Directe (AAD) sont supérieurs à 90/95 % et dans certaines populations, ils atteignent 100 %.

Votre spécialiste vous prescrira les AAD qui vous conviennent le mieux en fonction de votre génotype, de votre stade de fibrose, en tenant compte aussi de vos spécificités (co-infections VIH/VHB, surpoids, diabète, problèmes rénaux, addictions, traitements en cours...).

ATTENTION

Ces molécules ne sont disponibles à ce jour que dans les pharmacies hospitalières.

Renseignez-vous sur les heures d'ouverture et de délivrance (organisez-vous si vous partez en vacances ou à l'étranger).

CO-INFECTION VIH-VHC

Il n'est pas recommandé d'arrêter le traitement antirétroviral pour introduire le traitement de l'hépatite C.

Il est recommandé d'évaluer les interactions entre les molécules du traitement VHC avec les antirétroviraux.

Si nécessaire, avant l'initiation du traitement VHC, le médecin référent pour le VIH modifiera votre traitement antirétroviral pour éviter les interactions médicamenteuses.

Le traitement VHC et les doses sont les mêmes que pour un mono-infecté VHC.



SOVALDI® + DAKLINZA®	AVEC OU SANS	RIBAVIRINE	4/5		
SOVALDI® + OLYSIO®	AVEC OU SANS	RIBAVIRINE	6/7		
HARVONI®	AVEC OU SANS	RIBAVIRINE	8/9		
SOVALDI® +		RIBAVIRINE	10/11		
VIEKIRAX®	AVEC OU SANS	EXVIERA®	AVEC OU SANS	RIBAVIRINE	12/13
ZEPATIER®	AVEC OU SANS	RIBAVIRINE	14/15		
EPCLUSA®			16/17		
MAVIRET®			18/19		
VOSEVI®			20/21		
RIBAVIRINE			22		
BON A SAVOIR			23		

Echec & retraitement / Co-infection VHB-VHC / Interactions

LES MOLÉCULES « PANGÉNOTYPIQUES »

De nouvelles molécules antivirales à action directe (AAD) sont dites pangénotypiques quand elles sont efficaces sur tous les génotypes (1,2,3,4,5,6) et cela, le plus souvent, sans nécessiter de rajouter la ribavirine.

SOVALDI® + DAKLINZA® AVEC OU SANS RIBAVIRINE*

SOFOSBUVIR 400 mg

DACLASTAVIR 60 mg



Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :

1 comprimé SOVALDI® + 1 comprimé DAKLINZA®

le matin ou le soir **à la même heure avec** de la nourriture.

Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli.

N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés.

Si j'oublie mon comprimé SOLVADI®

à - de 18h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + de 18h, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

**JE NE DOUBLE
JAMAIS MA DOSE**

Si je vomis - de 2h après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1, sinon je prends mon comprimé à l'heure habituelle suivante.

Si j'oublie mon comprimé DAKLINZA®

à - de 20h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + de 20h, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

*Je stocke mes comprimés à température ambiante,
hors de portée des enfants.*



LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris**
pendant la grossesse ou l'allaitement



Ne pas consommer
pendant le traitement

**PAMPLEMOUSSE
& MILLEPERTUIS**



Les effets indésirables / secondaires

FATIGUE - MAUX DE TÊTE - NAUSÉES - TROUBLES DE L'ATTENTION

EXACERBATION DES MALADIES CARDIAQUES PRÉ-EXISTANTES - INSOMNIES

SENSATIONS D'HYPER-ACTIVITÉ : D'ÊTRE « BOOSTÉ », D'AVOIR « LA PÊCHE »

IRRITABILITÉ - APPÉTIT DIMINUÉ - TROUBLES DU SOMMEIL

Les interactions médicamenteuses

Avant le début de votre traitement,

si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes les interactions médicamenteuses.

Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD.

Vous pouvez vérifier sur le site : **hep-druginteractions.org**

SOVALDI®

Liste non exhaustive

ANTIARYTHMIQUE Amiodarone

ANALEPTIQUE Modafinil

ANTICONVULSIVANTS Carbamazépine, Phénytoïne

Phénobarbital, Oxcarbazépine

ANTIMYCOBACTERIENS Rifabutine, Rifampicine, Rifapentine

DAKLINZA®

Liste non exhaustive

ANTICONSULSIVANTS Phénytoïne, Carbamazépine
ou Phénobarbital

ANTITUBERCULEUX Rifampicine, Rifabutine

GLUCOCORTICOÏDE SYSTEMIQUE Dexaméthasone

SOVALDI® + OLYSIO® AVEC OU SANS RIBAVIRINE*

SOFOSBUVIR 400 mg SIMEPREVIR 150 mg



Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :

1 comprimé SOVALDI® + 1 gélule OLYSIO®

le matin ou le soir **à la même heure avec** de la nourriture.

Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli.

N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 le comprimé ou la gélule.

Si j'oublie mon comprimé SOVALDI®

à - de 18h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + de 18h, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

**JE NE DOUBLE
JAMAIS MA DOSE**

Si je vomis - de 2h après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1, sinon je prends mon comprimé à l'heure habituelle.

Si j'oublie ma gélule OLYSIO®

à - de 12h, je prends ma gélule oubliée et je prends la suivante à l'heure prévue habituellement.

à + de 12h, je ne prends pas ma gélule oubliée et j'attends l'horaire de la prise suivante.

*Je stocke mes comprimés à température ambiante,
hors de portée des enfants.*



LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris**
pendant la grossesse ou l'allaitement



Ne pas consommer
pendant le traitement

**PAMPLEMOUSSE
& MIELLEPERTUIS**

Les effets indésirables / secondaires

FATIGUE - MAUX DE TÊTE - NAUSÉES - DÉMANGEAISONS DE LA PEAU - ÉRUPTION CUTANÉE - CONSTIPATION - PRURIT
AUGMENTATION DE BILIRUBINE DANS LE SANG
SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE, ÉVITEZ TOUTE EXPOSITION AU SOLEIL OU AUX RAYONS U.V. ARTIFICIELS (CABINE DE BRONZAGE)

Les interactions médicamenteuses

Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes les interactions médicamenteuses.
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD.
Vous pouvez vérifier sur le site : **hep-druginteractions.org**

SOVALDI®

Liste non exhaustive

ANTIARYTHMIQUE	Amiodarone
ANALÉPTIQUE	Modafinil
ANTICONSULSIVANTS	Carbamazépine, Phénytoïne Phénobarbital, Oxcarbazépine
ANTIMYCOBACTERIENS	Rifabutine, Rifampicine, Rifapentine

OLYSIO®

Liste non exhaustive

ANTICONSULSIVANTS	Phénytoïne, Carbamazépine Phénobarbital...
ANTITUBERCULEUX	Rifampicine, Rifabutine
GLUCOCORTICOÏDE SYSTEMIQUE	Dexaméthasone
ANTIFONGIQUES	Azols, Luconazole
ANTIBIOTIQUES DE LA CLASSE DES MACROLIDES	Erythromycine, Clarithromycine, Télithromycine
IMMUNOSUPPESSEUR	Ciclosporine

HARVONI® AVEC OU SANS RIBAVIRINE*

SOFOSBUVIR 400 mg
+ LEDIPASVIR 90 mg



Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :

1 comprimé HARVONI®

le matin ou le soir **à la même heure avec** de la nourriture.

Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli.

N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 le comprimé.

Si j'oublie mon comprimé HARVONI®

à - **de 18h**, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à **+ de 18h**, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

**JE NE DOUBLE
JAMAIS MA DOSE**

Si je vomis - de 5h après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1, sinon je prends mon comprimé à l'heure habituelle.

Si je vomis + de 5h après la prise de mon comprimé, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

CONSEIL D'HÉPATANT :

Choisissez de prendre votre comprimé le soir.

Je stocke mes comprimés à température ambiante, hors de portée des enfants.



LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris** pendant la grossesse ou l'allaitement



Ne pas consommer pendant le traitement

**PAMPLEMOUSSE
& MILLEPERTUIS**



Les effets indésirables / secondaires

MAUX DE TÊTE - FATIGUE - NAUSÉES - IRRITABILITÉ - TOUX - PRURIT - MUSCLES DOULOUREUX - MAL AU DOS ET AUX ARTICULATIONS

EN CAS DE FATIGUE APRES LA PRISE : NE PAS CONDUIRE ET NE PAS UTILISER DE MACHINES

EN CAS D'ANTÉCÉDENTS CARDIAQUES : SURVEILLER LA TENSION ET LE RYTHME CARDIAQUE

INSOMNIES - SENSATIONS D'HYPER-ACTIVITÉ, D'ÊTRE « BOOSTÉ », D'AVOIR « LA PÊCHE »

Les interactions médicamenteuses

Si vous prenez un antiacide,

prenez-le au moins 4h avant ou au moins 4h après HARVONI®

Si vous prenez un inhibiteur de la pompe à protons,

prenez-le au même moment qu'HARVONI®. Ne le prenez pas avant HARVONI®

Avant le début de votre traitement,

si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes les interactions médicamenteuses.

Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD.

Vous pouvez vérifier sur le site : **hep-druginteractions.org**

HARVONI®

Liste non exhaustive

ANTIARYTHMIQUE Amiodarone

ANALEPTIQUE Modafinil

ANTICONVULSIVANTS Carbamazépine, Phénytoïne

Phénobarbital, Oxcarbazépine

ANTIMYCOBACTERIENS Rifabutine, Rifampicine, Rifapentine

SOVALDI® + RIBAVIRINE*

SOFOSBUVIR 400 mg 200 mg ou 400 mg



Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :

1 comprimé SOVALDI® en 1 prise (le matin **OU le soir)
+ RIBAVIRINE* selon posologie :
au minimum 800 mg ou au maximum 1200 mg
en 2 prises (le matin **ET** le soir)**

à la même heure avec de la nourriture.

Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli.

N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés.

Si j'oublie mon comprimé SOVALDI®

à - **de 18h**, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à **+ de 18h**, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

Si je vomis - de 2h après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1, sinon je prends mon comprimé à l'heure habituelle.

Si je vomis + de 2h après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1, sinon je prends mon comprimé à l'heure habituelle.

**JE NE DOUBLE
JAMAIS MA DOSE**

*Je stocke mes comprimés à température ambiante,
hors de portée des enfants.*



LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris**
pendant la grossesse ou l'allaitement



Ne pas consommer
pendant le traitement

**PAMPLEMOUSSE
& MILLEPERTUIS**



Les effets indésirables / secondaires

FATIGUE - MAUX DE TÊTE - NAUSÉES

TENSION : À SURVEILLER QUAND PROBLÈMES CARDIAQUES

DOULEURS ABDOMINALES - INSOMNIES

SENSATIONS D'HYPER-ACTIVITÉ, D'ÊTRE « BOOSTÉ », D'AVOIR « LA PÊCHE »

ANÉMIE

Les interactions médicamenteuses

Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes interactions médicamenteuses.
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD.

Vous pouvez vérifier sur le site : **hep-druginteractions.org**

SOVALDI®

Liste non exhaustive

ANTIARYTHMIQUE	Amodiarone
ANALEPTIQUE	Modafinil
ANTICONVULSIVANTS	Carbamazépine, Phénytoïne Phénobarbital, Oxcarbazépine
ANTIMYCOBACTERIENS	Rifabutine, Rifampicine, Rifapentine

VIEKIRAX® AVEC OU SANS EXVIERA® AVEC OU SANS RIBAVIRINE*

OMBITASVIR 12,5 mg
+ RITONAVIR 50 mg
+ PARITAPREVIR 75 mg

DASABUVIR 250 mg



Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :

2 comprimés VIEKIRAX® en une fois (le matin **OU le soir)
AVEC ou SANS**

1 comprimé EXVIERA® le matin **ET 1 comprimé le soir
à la même heure avec** de la nourriture.

Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli.

N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés.

Si j'oublie mes comprimés VIEKIRAX®

à - **de 12h**, je prends mes comprimés oubliés et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + **de 12h**, je ne prends pas mes comprimés oubliés et j'attends l'horaire de la prise suivante.

**JE NE DOUBLE
JAMAIS MA DOSE**

Si j'oublie mon comprimé EXVIERA®

à - **de 6h**, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + **de 6h**, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

*Je stocke mes comprimés à température ambiante,
hors de portée des enfants.*



LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris**
pendant la grossesse ou l'allaitement



Ne pas consommer
pendant le traitement

**PAMPLEMOUSSE
& MILLEPERTUIS**

Les effets indésirables / secondaires

TRÈS GRANDE FATIGUE - NAUSÉES - TROUBLES DU SOMMEIL - DÉMANGEAISONS PRURIT

EN CAS DE FATIGUE APRES LA PRISE : NE PAS CONDUIRE ET NE PAS UTILISER DE MACHINES

Lorsque vous prenez VIEKIRAX® avec ou sans EXVIERA®,
informez votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants :
- vous avez des nausées (mal au cœur), des vomissements
ou une perte d'appétit ;
- vous remarquez un jaunissement de votre peau ou du blanc de l'œil ;
- vos urines sont plus foncées que d'habitude.

Les contre-indications

VIEKIRAX®/EXVIERA® sont contre-indiqués
pour le traitement des cirrhoses décompensées : **F4 CHILD B & C**

Les interactions médicamenteuses

Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes les interactions médicamenteuses.
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD.
Vous pouvez vérifier sur le site : **hep-druginteractions.org**

VIEKIRAX® & EXVIERA®

ANTIARYTHMIQUE	Amiodarone
STATINE	Rosuvastine
ANTIGOUTTE	Colchicine
CONTRACEPTIFS	Contenant de l'Éthinylestradiol

ZEPATIER® AVEC OU SANS RIBAVIRINE*

GRAZOPREVR 100 mg
+ ELBASVIR 50 mg



Ma dose par jour pendant 12 ou 16 semaines :

1 comprimé ZEPATIER®

le matin ou le soir **à la même heure** avec ou sans nourriture.

Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli.

N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 le comprimé.

Si j'oublie mon comprimé ZEPATIER®

à - de 16h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + de 16h, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

Si je vomis - de 4h après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1 jusqu'à 8h avant la prise de la dose suivante, sinon je prends mon comprimé à l'heure habituelle.

Si je vomis + de 4h après la prise de mon comprimé, aucune autre dose n'est nécessaire.

**JE NE DOUBLE
JAMAIS MA DOSE**

*Je stocke mes comprimés à température ambiante,
hors de portée des enfants.*



LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris**
pendant la grossesse ou l'allaitement



Ne pas consommer
pendant le traitement

**PAMPLEMOUSSE
& MILLEPERTUIS**

Les effets indésirables / secondaires

FATIGUE - MAUX DE TÊTE - NAUSÉES - DIARRHÉE - INSOMNIES

Les interactions médicamenteuses

- Aucune interaction avec les traitements de substitution (Buprénorphine, Naloxone, Méthadone)
- Recommandé pour les insuffisants rénaux et dialysés génotype 1&4

Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes les interactions médicamenteuses.
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD.

Vous pouvez vérifier sur le site : hep-druginteractions.org

ZEPATIER®

Liste non exhaustive

ANTIMYCOBACTÉRIEN	Rifampine
ANTICONSULSIVANTS	Phénytoïne, Carbamazépine
ANTIFONGIQUE	Kétoconazole
ANTICOAGULANT	Dabigatran éxétilate
IMMUNOSUPPRESSEUR	Ciclosporine
ANTAGONISTE ENDOTHELIN	Bosentan

EPCLUSA® AVEC OU SANS RIBAVIRINE*

SOFOBUVIR 400 mg
+ VELPATASVIR 100 mg



PANGÉNOTYPIQUE

Ma dose par jour pendant 12 semaines :

1 comprimé EPCLUSA®

une fois par jour, **toujours à la même heure** avec ou sans nourriture.

Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli.

N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 le comprimé.

Si j'oublie mon comprimé EPCLUSA®

à - de **18h**, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + de **18h**, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

**JE NE DOUBLE
JAMAIS MA DOSE**

Si je vomis - de 3h après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1 avant la prise de la dose suivante.

Si je vomis + de 3h après la prise de mon comprimé, aucune autre dose n'est nécessaire.

*Je stocke mes comprimés à température ambiante,
hors de portée des enfants.*



LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris**
pendant la grossesse ou l'allaitement

Ne pas consommer
pendant le traitement

**PAMPLEMOUSSE
& MILLEPERTUIS**

Les effets indésirables / secondaires

FATIGUE - MAUX DE TÊTE - NAUSÉES - VERTIGE - DIARRHÉE
TROUBLES DU SOMMEIL - TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX
TROUBLES DE L'APPÉTIT - TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES

Les interactions médicamenteuses

Si vous nécessitez la prise d'un inhibiteur de la pompe à protons,
prenez EPCLUSA® avec de la nourriture 4h avant la prise de l'inhibiteur.

Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes les interactions médicamenteuses.
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD.
Vous pouvez vérifier sur le site : **hep-druginteractions.org**

EPCLUSA®

Liste non exhaustive

ANTIARYTHMIQUE	Amiodarone
ANALÉPTIQUE	Modafinil
ANTICONVULSIVANTS	Carbamazépine, Phénytoïne, Phénobarbital, Oxcarbazépine
ANTIMYCOBACTERIENS	Rifabutine, Rifampicine, Rifapentine

MAVIRET®

GLECAPREVIR 100 mg
+ PIBRENTASVIR 40 mg

PANGENOTYPIQUE



DISPONIBLE
EN 2018

Ma dose par jour pendant 8, 12 ou 16 semaines :

3 comprimés MAVIRET®

une fois par jour, **toujours à la même heure** avec ou sans nourriture.

Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli.

N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés

Si j'oublie mes comprimés MAVIRET®

à - **de 18h**, je prends mes comprimés oubliés et je prends les suivants à l'heure prévue habituellement.

à + **de 18h**, je ne prends pas mes comprimés oubliés et j'attends l'horaire de la prise suivante.

**JE NE DOUBLE
JAMAIS MA DOSE**

Si je vomis - de 3h après la prise des 3 comprimés, je les reprends.

Si je vomis + de 3h après la prise des 3 comprimés, je n'en reprends pas.

Je stocke mes comprimés à température ambiante,
hors de portée des enfants.



LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris**
pendant la grossesse ou l'allaitement



Ne pas consommer
pendant le traitement

**PAMPLEMOUSSE
& MILLEPERTUIS**



Les effets indésirables / secondaires

MAUX DE TÊTE - FATIGUE - NAUSÉES - DIARRHÉE - PRURIT - SE SENTIR FAIBLE,
MANQUE D'ÉNERGIE

Les contre-indications

MAVIRET® est contre-indiqué avec

- les **HYPOLIPÉMIANTS** : Atorvastatine, Simvastatine,
- les **CONTRACEPTIFS** contenant de l'Éthinylestradiol (pilules contraceptives et anneaux vaginaux),

L'administration concomitante de MAVIRET® avec des produits contenant de l'Éthinylestradiol est contre-indiquée en raison du risque d'élévation du taux d'ALAT.

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire avec le Lévonorgestrel, la Noréthistérone, ou le Norgestimate utilisés comme contraceptifs progestatifs.

- l'**ANTICOAGULANT** : Dabigatran éxétilate

Les interactions médicamenteuses

Avant le début de votre traitement,

si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin.

Vous pouvez vérifier sur le site : hep-druginteractions.org

MAVIRET®

Liste non exhaustive

HYPOLIPÉMIANTS	Fluvastatine, Lovastatine, Pitavastatine, Pravastatine, Rosuvastatine
ANTIMYCOBACTÉRIEN	Rifampicine
PROBLÈMES CARDIAQUES	Digoxine
INHIBITEUR DE LA POMPE À PROTON	Omeprazole
ANTICOAGULANT	Warfarine
IMMUNOSUPPRESSEURS	Ciclosporine, Tacrolimus

VOSEVI®

SOFOSBUVIR 400 mg
+ VELPATASVIR 100 mg
+ VOXILAPREVIR 100 mg



PANGENOTYPIQUE

**DISPONIBLE
EN 2018**

Ma dose par jour pendant 8 ou 12 semaines :

1 comprimé VOSEVI®

une fois par jour, **toujours à la même heure** avec ou sans nourriture.

Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli.

N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 le comprimé.

Si j'oublie mon comprimé VOSEVI®

à - **de 18h**, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à **+ de 18h**, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

Si je vomis - de 4h après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1 avant la prise de la dose suivante.

Si je vomis + de 4h après la prise de mon comprimé, aucune autre dose n'est nécessaire.

**JE NE DOUBLE
JAMAIS MA DOSE**

*Je stocke mes comprimés à température ambiante,
hors de portée des enfants.*



LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris**
pendant la grossesse ou l'allaitement



Ne pas consommer
pendant le traitement

**PAMPLEMOUSSE
& MILLEPERTUIS**

Les effets indésirables / secondaires

MAUX DE TÊTE - FATIGUE - NAUSÉES - DIARRHÉE - PERTE D'APPÉTIT
TROUBLES DU SOMMEIL - INSOMNIES - MOINS D'ÉNERGIE OU DE FORCE
MYALGIE (DOULEUR MUSCULAIRE)
AUGMENTATION DE LA BILIRUBINE PENDANT LE TRAITEMENT CHEZ LES
CIRRHOTIQUES. RETOUR À LA NORME APRÈS TRAITEMENT

Les contre-indications

VOSEVI® est contre -indiqué avec

- les **CONTRACEPTIFS** contenant de l'Éthinylestradiol (pilules contraceptives)
 - l'**ANTICOAGULANT** : Diabigatran étéxilate
- les **ANTIMYCOBACTÉRIENS** : Rifampicine, Rifabutin, Rifapentine
 - l'**ANXIOLYTIQUE/ANTICONVULSIVANT** : Phénobarbital
- les **ANTICONVULSIVANTS** : Carbamazépine, Phénytoïne
 - l'**HYPOLIPÉMIANT** : Rosuvastatine

Les interactions médicamenteuses

Les antiacides doivent être pris à 4h de distance de VOSEVI® (avant ou après).

Avant le début de votre traitement,

si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin.

Vous pouvez vérifier sur le site : **hep-druginteractions.org**

VOSEVI®

Liste non exhaustive

ANTIARYTHMIQUE	Amiodarone
HYPOLIPÉMIANTS	Atorvastatine, Lovastatine, Fluvastatine, Pravastatine, Simvastatine
IMMUNOSUPPRESSEUR	Ciclosporine
ANTIHISTAMINIQUES H2 (problèmes gastriques)	Nizatidine, Famotidine, Cimetidine, Ranitidine
ANTITUBERCULEUX	Rifabutine, Rifapentine
ANTICOAGULANTS	Edoxaban, Warfarine & autres médicaments antagonistes de la vitamine K
PROBLÈMES CARDIAQUES	Digoxine

COPEGUS® ou REBETOL® ou RIBAVIRINE

Dans certains cas, l'ajout de la RIBAVIRINE permet d'améliorer l'efficacité du traitement et donc du nombre de guérisons. Cela peut permettre aussi un traitement en 12 semaines au lieu de 24.

2 dosages existent :

Comprimé ou gélule de 200 mg ou de 400 mg.
Votre médecin vous indiquera la dose à prendre, celle du matin et celle du soir.

La RIBAVIRINE :

doit être prise le matin **ET** le soir **avec** de la nourriture «grasse» (tartine beurrée ou croissant ou yaourt par ex. au petit déjeuner).

Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés ou les gélules.

Les effets indésirables / secondaires

ANÉMIE LIÉE À LA DESTRUCTION DES GLOBULES ROUGES (HÉMOLYSE) QUI PEUT ENTRAÎNER UN MANQUE D'APPÉTIT, UNE GROSSE FATIGUE, DES PALPITATIONS, MAUX DE TÊTE, TOUX ET ESSOUFFLEMENT.

GOÛT «DE FERRAILLE» APRÈS INGESTION.

RIBAVIRINE CONTRE-INDIQUÉE QUAND INSUFFISANCE RÉNALE SÉVÈRE.

La grossesse est formellement contre-indiquée pendant le traitement :
risques de malformation importants.

Pour concevoir un enfant après le traitement, la femme attendra 4 mois et l'homme 7 mois.

Si l'homme commence un traitement alors que sa femme est enceinte, **préservatif obligatoire** pour empêcher le fœtus d'être en contact avec la ribavirine présente dans le sperme.

Echec 1^{er} traitement & retraitement

Les personnes en échec d'un 1^{er} traitement par antiviral à action directe (AAD) ont maintenant plusieurs autres médicaments à disposition notamment les molécules « pangénotypiques ».

Leur dossier sera discuté lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) afin de leur proposer un nouveau traitement adapté à leur cas.

Réactivation du virus de l'hépatite B

Un dépistage du VHB doit être réalisé chez tous les patients avant l'initiation du traitement. Les patients co-infectés par le VHB et le VHC sont exposés à un risque de réactivation du VHB pendant ou après un traitement par des agents antiviraux à action directe et doivent par conséquent être surveillés et pris en charge conformément aux recommandations cliniques en vigueur.

Interactions médicamenteuses

Lors de votre consultation, précisez bien à votre hépatologue ou pharmacien **TOUS les médicaments, plantes, traitement alternatif ou de phytothérapie que vous prenez.**

Certaines associations de médicaments peuvent être dangereuses ; baisser l'efficacité du traitement ; provoquer des effets indésirables.

La liste des interactions est trop longue pour que nous puissions l'inclure dans ce livret.

N'hésitez pas à nous contacter pour signaler tout effet secondaire
contact@soshepatites.org ou directement,
sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament.
ansm.sante.fr